

## 临床应用

直接涂在疱疹皮肤创面，每日 2 ~ 3 次，对发生在眼耳、头部的重症带状疱疹患者同时口服季德胜蛇药片，每次 4 片，每日 2 次，6 日为一疗程。同时将 41 例带状疱疹患者用阿昔洛韦片治疗作为对照组。治疗结果：季德胜蛇药片止疱时间  $2.7 \pm 1.5$  天，结痂时间  $3.0 \pm 0.8$  天，止痛时间  $3.5 \pm 1.5$  天。痊愈 42 例（87.5%），显效 4 例（8.3%），有效 2 例（4.1%），总显效率 95.8%，明显高于阿昔洛韦组，且在止疱、结痂、止痛时间方面亦优于对照组。

**6. 流行性腮腺炎：**用本药片治疗流行性腮腺炎 110 例，用大青叶汁黄酒溶化本药片调为稀糊状，或研粉调醋，外涂于患儿两侧腮腺范围至颌下，一日三次，睡前再涂一次，并服用本药 2 片，一日三次至症状消失，平均 3 天痊愈。

**7. 乙型肝炎：**治疗慢性活动性乙型肝炎 40 例，每日服本药片 2 次，每次 10 片，疗程 40 天。结果 HBsAg 转阴率为 60%，抗 -HBc 转阴率为 47.5%，HBeAg 转阴率为 75%，但抗 -HBs 仍持续阴性。临床症状、体征均有明显减轻甚至消失，肝功能亦均有不同程度改善。应用本药片配合穴位注射法治疗乙型肝炎 60 例，口服本药片，每次 10 例，每日 2 次，早晚以柴苓茶送服，3 个月为一疗程，并配合穴位注射法治疗，经一个疗程治疗，复查肝功能和二对半，结果 HBeAg 阴转 42 例，HBsAg 阴转 45 例，抗 -HBc 阴转 44 例，抗 -HBs 阳转 44 例，肝功能测定各项指标均正常。

**8. 耳廓软骨膜炎：**应用本药片与云南白药治愈急性化脓性耳廓软骨膜炎 13 例，先将患耳局部消毒后，用穿刺针抽空液体，然后将本药 4 ~ 10 片，以 75% 酒精浸泡研碎加云南白药 0.1 ~ 0.3，调成稀糊状敷于耳廓前后，涂药范围应超过炎症区 1cm，待半干后用纱布覆盖、胶布固定，隔日换药一次。其中 7 例是在使用抗生素无效时该用本药片而痊愈。6 例单独使用本药片而治愈。

**9. 痛风性关节炎：**湖北医药学院附属人民医院用季德胜蛇药片治疗急性痛风性关节炎 30 例，男 22 例，女 8 例，年龄 35-78 岁，平均病程（ $6 \pm 3$ ）年，均表现为受累关节红肿热痛，且四肢关节疼痛剧烈，不能屈伸。治疗方法：根据患部面积用季德胜蛇药片 10 片，碾成粉末，加适量食用白醋，调成稀糊状外敷患处。每日换药 1 ~ 2 次，连用 3 ~ 5 d。治疗结果：30 例全部有效，其中痊愈 20 例，显效 8 例，有效 2 例。

**10. 过敏性阴茎包皮水肿：**应用本药片治疗过敏性阴茎包皮水肿 21 例，内服本药片每 6 小时 1 次，每次 8 片，另用 5 ~ 10 片和温开水调成糊状外敷患部及阴茎根部（不要涂在尿道口上），每日换药 3 次，结果全部治愈，其中 1 ~ 2 天治愈 17 例，3 天治愈 4 例。

**11. 散发性脑炎：**应用本药片治疗散发性脑炎 30 例，每日 30 片，分 3 次口服，2 周后减半给药，30 天停药；与西药激素对照治疗 30 例比较，结果蛇药组痊愈 24 例，显效 5 例，有效 1 例；激素组痊愈 14 例，显效 10 例，无效 4 例（其中死亡 3 例）。临床治疗还表明本药片在治疗散发性脑炎比单纯西药有起效快，治愈率高，近、远期疗效均好的优点。在散发性脑炎 5 例的治疗中，不用皮质激素，口服蛇药片，并辅以维生素 B 族药物和神经细胞活化剂，若发热、白细胞增高者给予青霉素肌注，头痛、失眠者对症处理。结果 5 例全部治愈。亦有应用本药片治愈 2 例重症散发性脑炎。

**12. 其他：**应用本药片并结合用西药强的松治疗 15 例肾病综合征患儿，疗效满意。

治疗疥疮，将本药片研粉，用适量茶油或凡士林等调匀，搽于患处，每天 1 ~ 2 次，连用 3 ~ 4 次可愈。

用本药片治疗盘状红斑狼疮 9 例，效果较好。采用本药片外敷治疗手指急性化脓性感染 140 例，效果满意。外敷治疗丹毒效果亦很好。

## 规格/批准文号

每片重 0.4g 国药准字 Z32020048

## 精华制药集团股份有限公司

公司地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

邮政编码：226005

电话号码：（0513）85609111 85609126

传真号码：（0513）85609115

网 址：www.ntjhz.com

电子邮箱：ntjh@jhoa.net



国家绝密配方

国家中药保护品种 国家基本药物

国家基本医疗保险和工伤保险药品

国家中医医院急诊科室必备用药

解放军总后勤部战备药品

中医临床诊疗指南释义推荐用药



# 季德胜蛇药片

JIDESHENG ANTIVENOM TABLETS

百年传世特效解毒药



## 清热解毒 消肿止痛



精華製藥集團股份有限公司  
Jinghua Pharmaceutical Group Co., Ltd.

季德胜蛇药片，曾用名南通蛇药片、季德胜解毒片，是中国医学科学院特邀研究员，著名蛇药专家季德胜先生根据祖传六世秘方、结合几十年实践经验研制而成传世品牌中药。其专用商标季德胜牌商标自 1992 年以来一直被评为江苏省著名商标，被列入国家保密品种，其处方、工艺列入国家保密（绝密级），解放军总后勤部将季德胜蛇药片列为战备药品。

该产品由于组方科学合理，具有清热解毒、消肿止痛之功效。除主治传统的毒蛇、毒虫咬伤外，现代药理及临床研究，本品还具有抗病毒、消炎、杀菌、祛肿、化腐生肌、改善微循环，调节机体免疫力等作用，对病毒感染患、细菌传染病、免疫缺陷性等疾病疗效独特卓著。

## 功能与主治

清热解毒，消肿止痛。用于毒蛇、毒虫咬伤。

## 用 途

季德胜蛇药片不仅用于治疗毒蛇毒虫咬伤，还用于治疗病毒感染（带状疱疹、流行性腮腺炎、乙型肝炎等）、炎性疾病（痛风性关节炎、静脉炎等）、皮肤疾病（荨麻疹、痤疮）、肿瘤及疼痛等。

## 用法与用量

内服，外用均可。

内服：被毒蛇咬伤后，取本品20片，以温开水送服（如加少量酒更好）。以后每隔6小时续服10片，至中毒症状明显消失。

外用：被毒虫咬伤后，以本品和水外搽，即可消肿。

其它病症需服用时，请遵医嘱。

## 药理作用

主要有抗蛇毒，抗病毒，抗破伤风毒素，抗肿瘤，抗炎和镇痛等作用。

**1. 抗蛇毒：**单味半边莲以及从中分离出的琥珀酸钠、延胡索酸钠、羟基苯甲酸钠均具有抗蛇毒作用。

**2. 抗病毒：**由武汉大学医学院病毒研究所（国家级药理实验室）杨占秋所长主持完成。本项目细胞内试验采用细胞病变抑制实验和病毒抑制率等指标评价该药的抗 VZV 动物体内试验用疱疹病毒感染豚鼠建立皮肤疱疹模型，在感染后第 3 天用 0.3%、0.6% 和 1.2% 三种不同剂量季德胜蛇药片外用，及口服加外用治疗病毒感染鼠，并以阿昔洛韦作为阳性物对照，通过观察疱疹愈合情况及治疗后的不同时间疱疹病灶中病毒检出率评价起疗效。通过细胞内及动物体内试验两者指标来评价该药的抗 VZV 研究结果表明季德胜蛇药片可以抑制病毒生长，并且随着时间的延长而加强，观察 5 天时，实验组病毒抑制率可高达 95.2%，治疗指数为 25，与阳性对照物比较，蛇药片的药物毒性明显低于 AVC，表现在 TD50 大于 AVC，而且治疗指数也大于 AVC，这说明化学合成药物的毒性较蛇药片高。

**3. 抗破伤风毒素：**将破伤风毒素以硼酸盐缓冲液稀释 2000 倍，与 25% 蛇药片乙醇提取物及含 2% 吐温 -80 的硼酸缓冲液各自等量混合，分别为实验组及对照组所用毒素，每鼠皮下注射 0.4 ml，结果蛇药片对破伤风毒素有直接破坏作用。在实验小鼠破伤风模型上的实验，表明蛇药片乙醇提取物具有明显的治疗作用，可提高小鼠存活率，并可抑制破伤风的发展。

**4. 抗肿瘤：**采用人肝癌细胞 Hep-G2 作为细胞模型。以季德胜蛇药给中国大耳白兔灌胃制备含药血清。以不同浓度的含药兔血清培养 Hep-G2，并同时设相应浓度的正常兔血清对照组。12.5%和 15%的含药血清作用于细胞 12 小时和 24 小时后，对 Hep-G2 的增殖均有抑制作用 (P<0.05)，10%和 12.5%的药物血清组作用于 Hep-G2 细胞 12 小时后，细胞凋亡率均明显高于相应的正常对照组 (P<0.01)。表明季德胜蛇药血清对 Hep-G2 细胞的增殖有抑制作用，并可诱导其凋亡。

# 清 热 解 毒

# 消 肿 止 痛



## 季德胜蛇药片

百年传世特效解毒药

**5. 镇痛：**大鼠注射福尔马林制作致痛模型，季德胜蛇药组在降低大鼠的第一、二相行为反应时间之和上小于扶他林组及复方利多卡因组（P <0.05），说明季德胜蛇药片具有明显的抗伤害性反应，且作用强于扶他林乳胶剂和利多卡因乳膏。此外，通过大鼠的机械痛敏和热痛敏变化、注射足水肿变化、体重变化等实验情况总结得出，季德胜蛇药片能够减轻水肿、降低炎症反应，抑制痛觉过敏。季德胜蛇药片抗大鼠伤害性反应的机制可能与降低脊髓水平 c-Fos 蛋白表达有关。

**6. 抗炎：**蟾酥具有抗炎镇痛作用。

**7. 镇静：**无论给小鼠腹腔注射或口服蛇药片乙醇提取物，均能促进小鼠的睡眠。

## 临床应用

季德胜蛇药片不仅用于治疗毒蛇毒虫咬伤，还用于治疗病毒感染（带状疱疹、流行性腮腺炎、乙型肝炎等）、肿瘤及疼痛。

**1. 毒蛇与毒虫咬伤：**应用中西医结合治疗蝮蛇 503 例，局部处理，用高锰酸钾溶液冲洗伤口；七叶一枝花酊涂擦患肢，外敷芙蓉膏；呼吸麻痹者外贴麝香膏；内服本药片，每次 10 片，每日 4 次，首次加倍 服蛇伤解毒汤，每日 1 剂，辨证加减。结果，痊愈：轻型 370 例（100%）、重型 88 例（100%）、危型 33 例（73.3%）；无效 12 例。

应用本药片治疗毒虫咬伤 16 例，其中黄蜂蛰伤者 9 例、蜈蚣咬伤者 4 例、蚊虫叮咬伤者 3 例，用本药 3 ~ 5 片，温开水调成稀糊状，外搽局部，轻者每隔 30 分钟搽 1 次，重者见药液干即搽，16 例全部治愈。一般外搽 2 ~ 5 次见效，用药 1 ~ 2 天可愈。

**2. 隐翅虫皮炎：**应用本药片治疗隐翅虫皮炎 28 例，将药片研粉加水或 70% 酒精（也可用白酒）调成糊状涂于患处，每日 1 ~ 2 次，结果 5 天内治愈 17 例，7 天内治愈 11 例，治疗过程中未发现有毒副作用和过敏反应。用本药片治隐翅虫皮炎 58 例全部治愈，用本药片内服外搽治疗隐翅虫皮炎 15 例均于 5 天内痊愈。

**3. 蜱虫咬伤：**新疆 8660 部队医院用季德胜蛇药片治疗蜱咬伤 50 例，男 49 例，女 1 例，年龄 19~21 岁，均在劳动或训练中接触草木被蜱咬伤，部分咬伤处留有蜱残体，咬伤颈部 21 例，下肢 15 例，头部 8 例，上肢 4 例，腹部 2 例。咬伤处均有肿痛，其中 12 例咬伤局部继发感染、红肿痛明显，且伴有头痛、发热，局部淋巴结肿大，周围血白细胞轻度增高，无神经系统症状和体征。治疗方法：局部伤口用 3% 过氧化氢和生理盐水冲洗，有蜱残体者先清除，用凉开水将季德胜蛇药片调成糊状外敷，每日 1 次。同时口服蛇药片 5 片，每日 3 次。12 例继发感染者给予肌注或静滴青霉素治疗。治疗结果：局部红、肿、痛消失为治愈。50 例全部治愈，治愈天数 37 天，平均 4.9 天，均无不良反应。

**4. 肿瘤及疼痛：**季德胜蛇药联合肝动脉化疗栓塞（TACE）治疗中晚期肝癌，晚期原发性肝癌 28 例，14 例接受季德胜蛇药联合 TACE 治疗，14 例只进行 TACE。治疗 3 个月时，联合组肿瘤应答率为 78.6%，明显高于对照组的 57.1% (P<0.05)，患者生活质量改善率分别为 71.4% 和 50.0% (P<0.05)。季德胜蛇药联合 TACE 治疗中晚期肝癌可提高疗效，可改善患者生活质量。季德胜蛇药片口服与穴位贴敷同时进行，口服从小剂量 3 片开始，日服二次，渐加量 5~6 片，过二日再降至 3~4 片，一周为一疗程，间断服药。穴位贴敷将蛇药碾细，用胶布将 1~2 片量蛇药粉固定于相应穴位，隔日换药，三次为一疗程，治疗癌性疼痛 36 例总缓解率为 89%。

**5. 带状疱疹：**1996 年 6 月至 1997 年 9 月，中国中医研究院在坦桑尼亚开设中医研治爱滋病专科门诊，在确诊为爱滋病毒感染患者中，对 42 例急性带状疱疹患者中的 16 例采用季德胜蛇药片作为治疗组，同时将 16 例用龙胆泻肝丸治疗作为中药对照组，另外 10 例为西药对照组。病例的确证严格按照世界卫生组织对成人爱滋病的病例定义，疗效也根据中坦试治爱滋病协作组制定的标准认定。治疗结果：采用季氏蛇药治疗后有 8 例痊愈，6 例有效，总有效率为 87.5%。龙胆泻肝丸中药对照组、西药对照组的总有效率为 50%。

北京协和医院、上海闵行区中心医院采用季德胜蛇药片治疗带状疱疹 48 例，男 25 例，女 23 例，年龄 16 ~ 78 岁，病程 2 ~ 14 天，平均 6 天，疼痛 2 ~ 14 天，平均 5.7 天。临床表现为红斑基底上群集的丘疱疹、血疱及水疱。分布胸背 18 例，腰腹部 14 例，头颈 8 例，四肢 5 例，臀部 3 例。治疗方法：季德胜蛇药片根据皮损面积大小研成末后加米醋适量调成糊状，